

"Šis noteicējs tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiālo atbalstu. Par šī noteicēja saturu pilnībā atbild Tartu vides izglītības centrs un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli."

"Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežas attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.estlatrus.eu."

Izdevumu sagatavojis Tartu vides izglītības centrs un latviešu valodā izdevusi Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas- Latvijas -Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ELRI-156 "Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības apziņas veidošanai" ietvaros.

IESKATIES DABĀ!

Biežāk sastopamie koki un krūmi pilsētvidē

	Augstums	Zari	Ziedēšanas laiks	Augļi nogatavojas
PUMPURI SAKĀRTOTI PRETĒJI				
AUGSTI KOKI				
Parastā kļava – <i>Acer platanoides</i>	līdz 30 m	sarkanīgi vai dzeltenīgi brūni	maijs	septembrī, nokrīt līdz decembra vidum
Parastais osis – <i>Fraxinus excelsior</i>	20 – 25 m	zaļganpelēki, gaiši	maijs	oktobrī, nokrīt līdz pavasarim
Parastā zirgkastaņa – <i>Aesculus hippocastanum</i>	līdz 25 m	brūni	maijs	septembrī, nokrīt uzreiz
ZEMI KOKI				
Ošlapu kļava – <i>Acer negundo</i>	līdz 15 m	zaļi vai zilganzaļi, "apsarmojuši"	aprīļa beigās - maijā, divmājnieks	oktobrī, saglabājas kokā līdz pavasarim
KRŪMI				
Sarkanais plūškoks – <i>Sambucus racemosa</i>	līdz 4 m	brūni līdz pelēki	maijs	augustā; ar augļiem barojas putni
Parastais filadelfs – <i>Philadelphus coronarius</i>	1,5 – 3 m	brūni, siki un trausli	jūnijs	oktobrī, saglabājas krūmā līdz pavasarim
Parastais ceriņš – <i>Syringa vulgaris</i>	līdz 6 m	pelēkbrūni, kailli	jūnijs	septembrī - oktobrī, saglabājas krūmā līdz pavasarim
PUMPURI SAKĀRTOTI PAMIŠUS				
AUGSTI KOKI				
Parastais ozols – <i>Quercus robur</i>	virs 20 m	brūni	maijs	septembrī, nokrīt septembrī - oktobrī
Apšu ģints – <i>Populus</i>	25 – 30 m	dzeltenīgi vai brūni, gludi	aprīlis - maijs, divmājnieks	jūnijā - jūlijā, nokrīt jūlijā
Āra bērzs – <i>Betula pendula</i>	virs 25 m	brūni, ar kārpveidīgiem dziedzeriem, dažkārt gludi	aprīlis - maijs	jūlija beigās, nokrīt augustā
Purva bērzs – <i>Betula pubescens</i>	18 – 23 m	pelēkbrūni, klāti ar matiņiem vai gludi	aprīlis - maijs	jūlija beigās, nokrīt augustā
Parastā liepa – <i>Tilia cordata</i>	25 – 30 m	sarkanbrūni līdz dzeltenzaļi	jūlijs	septembrī - oktobrī, saglabājas kokā visu ziemu
Parastā goba – <i>Ulmus glabra</i>	24 – 30 m	brūni, stingri, likloču izlocīti, klāti ar matiņiem	aprīļa beigās	jūnija sākumā, nokrīt līdz jūnija beigām
Baltalksnis – <i>Alnus incana</i>	15 – 25 m	pelēkbrūni, klāti ar īsiem matiņiem	marts	oktobrī, nokrīt ziemā
ZEMI KOKI VAI AUGSTI KRŪMI				
Parastā lazda – <i>Corylus avellana</i>	5 – 10 m	brūngani, klāti ar dziedzersariņiem	aprīlis	septembrī
Parastā ieva – <i>Padus avium</i>	līdz 10 m	spodri brūni, paberzējot miza izdala spēcīgu aromātu	maijs	septembra beigās; ar augļiem barojas putni
Parastais pilādzis – <i>Sorbus aucuparia</i>	12 – 20 m	pelēkbrūni, pārklāti ar caurspīdīgu kārtu	maijs	līdz augusta vidum; augļus iecienījuši putni
Vilkābele – <i>Crataegus</i>	5 – 8 m	ērķšķi 4-6 cm gari, miza pelēkbrūna, jaunie dzinumi sarkanbrūni	maijs - jūnijs	septembrī; ar augļiem barojas putni ziemā
KRŪMI				
Spireju apakšdzimta – <i>Spiraea</i>	0,5 – 2 m	miza lobās, dzinumi dažkārt lokveidīgi un klāti ar matiņiem	maijs - septembris	augustā - oktobrī, ziemā saglabājas krūmā
Klīntēņu ģints – <i>Cotoneaster</i>	0,5 – 2 m	jaunie zari tūbaini, klāti ar matiņiem	jūnijs	septembrī, nokrīt septembrī - novembrī
Rožu ģints – <i>Rosa</i>	0,5 – 5 m	dzinumi ar dzeloņiem, zaļgani vai brūni	jūnijs - septembris	nogatavojas septembrī, ziemā saglabājas krūmā
Parastā bārbele – <i>Berberis vulgaris</i>	2 – 3 m	pelēkie zari ar gaiši zaļiem 1-2 cm gariem trīszuburainiem ērkšķiem; jaunie dzinumi ar vienkāršiem ērkšķiem un jaunie zari dzeltenīgi vai dzeltenbrūni	maijs - jūnijs	septembrī, saglabājas krūmā līdz ziemai
Alpu vērene – <i>Ribes alpinum</i>	1 – 2 m	jaunie dzinumi pelēki, vecākie zari brūni	maijs - jūnijs, divmājnieks	jūlijā; augļus iecienījuši putni



